

Einfache Bestellung nur mit Rezept! Kein Bestellbogen nötig!

## Bestellhilfe für ALLERGOVIT® Pollenpräparate<sup>1-4</sup>

- 1 Wahl des Präparats
- 2 Wahl der Stärke/ Packungsgröße  
1-Stärken-Aufdosierung\*: Stärke B oder BB  
Standardaufdosierung: Stärke AB oder ABB  
Fortsetzungsbehandlung: Stärke B oder BB
- 3 Eingabe der entsprechenden PZN in die Praxissoftware

| ALLERGOVIT®<br>Pollen SCIT                                      | Stärke /<br>Packungs-<br>größe | PZN      |
|---|--------------------------------|----------|
| 1   | 2                              | 3        |
| <b>ALLERGOVIT® BEH</b><br>Birke 35 %<br>Erle 30 %<br>Hasel 35 % | B (1x3 ml)                     | 15741328 |
|   | B B (2x3 ml)                   | 15741334 |
|   | A B (2x3 ml)                   | 15741305 |
|   | A B B (3x3 ml)                 | 15741311 |
| <b>ALLERGOVIT® BI</b><br>Birke 100 %                            | B (1x3 ml)                     | 15741386 |
|   | B B (2x3 ml)                   | 15741392 |
|   | A B (2x3 ml)                   | 15741340 |
|   | A B B (3x3 ml)                 | 15741357 |
| <b>ALLERGOVIT®</b><br>Gräser# 60 %<br>Roggen 20 %<br>Birke 20 % | B (1x3 ml)                     | 00534546 |
|   | B B (2x3 ml)                   | 09267638 |
|   | A B (2x3 ml)                   | 00534523 |
|   | A B B (3x3 ml)                 | 13167517 |
| <b>ALLERGOVIT® G</b><br>Gräser# 100 %                           | B (1x3 ml)                     | 15741535 |
|   | B B (2x3 ml)                   | 15741541 |
|   | A B (2x3 ml)                   | 15741512 |
|   | A B B (3x3 ml)                 | 15741529 |
| <b>ALLERGOVIT® GG</b><br>Gräser/Getreide## 100 %                | B (1x3 ml)                     | 15741452 |
|   | B B (2x3 ml)                   | 15741469 |
|   | A B (2x3 ml)                   | 15741423 |
|   | A B B (3x3 ml)                 | 15741446 |
| <b>ALLERGOVIT® GR</b><br>Gräser# 60 %<br>Roggen 40 %            | B (1x3 ml)                     | 15741498 |
|   | B B (2x3 ml)                   | 15741506 |
|   | A B (2x3 ml)                   | 15741475 |
|   | A B B (3x3 ml)                 | 15741481 |

| ALLERGOVIT®<br>Pollen SCIT   | Stärke /<br>Packungs-<br>größe | PZN      |
|--|--------------------------------|----------|
| 1  | 2                              | 3        |
| <b>ALLERGOVIT®</b><br>Gräser# 60 %<br>Roggen 20 %<br>Beifuß 20 %   | B (1x3 ml)                     | 00534380 |
|  | B B (2x3 ml)                   | 09267615 |
|  | A B (2x3 ml)                   | 00534374 |
| <b>ALLERGOVIT®</b><br>Gräser# 60 %<br>Roggen 20 %<br>Wegerich 20 % | B (1x3 ml)                     | 00534492 |
|  | B B (2x3 ml)                   | 09267727 |
|  | A B (2x3 ml)                   | 00534486 |
| Präparate mit nur Standardaufdosierung                             |                                |          |
| <b>ALLERGOVIT®</b><br>Beifuß 100 %                                 | A B (2x3 ml)                   | 00534233 |
|  | B (1x3 ml)                     | 00534256 |
|  | B B (2x3 ml)                   | 09267555 |
| <b>ALLERGOVIT®</b><br>Wegerich 100 %                               | A B (2x3 ml)                   | 00534658 |
|  | B (1x3 ml)                     | 00534664 |
|  | B B (2x3 ml)                   | 09267779 |
| <b>ALLERGOVIT®</b><br>Ragweed, short 100 %                         | A B (2x3 ml)                   | 15741630 |
|  | B (1x3 ml)                     | 15741676 |
|  | B B (2x3 ml)                   | 15741682 |
| <b>ALLERGOVIT®</b><br>Ölbaum 100 %                                 | A B (2x3 ml)                   | 15741593 |
|  | B (1x3 ml)                     | 15741618 |
|  | B B (2x3 ml)                   | 15741624 |

## Bestellhilfe für NOVO-HELISEN® Hausstaubmilben-Präparate<sup>5</sup>

- 1 Wahl des Präparats
- 2 Wahl der Stärke/ Packungsgröße  
1-Stärken-Aufdosierung\*\*: Stärke 3 oder 2 x 3  
Standardaufdosierung: Stärke 1-3  
Fortsetzungsbehandlung: Stärke 3 oder 2 x 3
- 3 Eingabe der entsprechenden PZN in die Praxissoftware

| NOVO-HELISEN®<br>Hausstaubmilben SCIT                            | Stärke /<br>Packungs-<br>größe | PZN      |
|--|--------------------------------|----------|
| 1  | 2                              | 3        |
| <b>NOVO-HELISEN®</b><br>D. farinae 50 %<br>D. pteronyssinus 50 % | 3 (1x4,5 ml)                   | 18490890 |
|  | 2 x 3 (2x4,5 ml)               | 18490915 |
|  | 1-3 (3x4,5 ml)                 | 18490884 |

1 Fachinformation ALLERGOVIT® Baumpollenpräparate, Stand April 2024  
 2 Fachinformation ALLERGOVIT® Gräser- und Getreidepollenpräparate, Stand Januar 2021  
 3 Fachinformation ALLERGOVIT® Kräuterpollenpräparate, Stand Januar 2021  
 4 Fachinformation ALLERGOVIT® Individuelle Präparate, Stand Januar 2021  
 5 Fachinformation NOVO-HELISEN® Hausstaubmilben-Präparate, Stand Februar 2023

\* Nur für zugelassene Baum-, Gräser- und Getreidepollenpräparate  
 \*\* ab 12 Jahren

# Honiggras, gemeines Knäuelgras, engl. Raygras, Wiesenlieschgras, Wiesenrispengras, Wiesenschwingel (alle zu gleichen Teilen)

## Gräser # 55 %, Gerste 10 %, Hafer 10 %, Roggen 15 %, Weizen 10 %


## Dosierungsempfehlungen ALLERGOVIT® Pollenpräparate

■ Stärke A

■ Stärke B


### 1-Stärken-Aufdosierung ab 5 Jahren

mit allen zugelassenen ALLERGOVIT® Baum-, Gräser- und Getreidepollenpräparaten<sup>1,2</sup>



### Standardaufdosierung ab 5 Jahren

mit allen ALLERGOVIT® Pollenpräparaten<sup>1-4</sup>



Stärke A: 1 000 TE/ml, Stärke B: 10 000 TE/ml. Die Standardisierung erfolgt in TE (Therapeutische Einheiten). \*Maßgeblich für die Dosierung ist in jedem Fall die individuelle Verträglichkeit. \*\*Präseasonal: Fortsetzungsbehandlung bis ca. 1 Woche vor Beginn des Pollenfluges möglich. Perennial: Dosisreduktion im Pollenflug beachten. Nicht erforderlich bei ALLERGOVIT® Baumpollenpräparaten in allen Altersgruppen und ALLERGOVIT® Gräser- und Getreidepollenpräparaten bei Erwachsenen.


## Dosierungsempfehlungen NOVO-HELISEN® Hausstaubmilben-Präparate

■ Stärke 1


■ Stärke 2

■ Stärke 3

### 1-Stärken-Aufdosierung ab 12 Jahren<sup>5</sup>



### Standardaufdosierung ab 5 Jahren<sup>5</sup>



Stärke 1: 50 TE/ml, Stärke 2: 500 TE/ml, Stärke 2: 5 000 TE/ml. Die Standardisierung erfolgt in TE (Therapeutische Einheiten). \*\*\*Maßgeblich für die Dosierung ist in jedem Fall die individuelle Verträglichkeit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation.

### ALLERGOVIT® Pollenpräparate

**Zusammensetzung:** Allergoide in Depotform aus Pollenallergenen zur spezifischen subkutanen Immuntherapie, standardisiert in Therapeutischen Einheiten (TE), an Aluminiumhydroxid adsorbiert, mit Phenol konserviert und in physiologischer Kochsalzlösung mit Natriumhydrogencarbonat suspendiert; Wasser für Injektionszwecke. Stärke A: 1 000 TE/ml, Stärke B: 10 000 TE/ml. **Anwendungsgebiete:** Zur kausalen Behandlung allergischer (IgE-vermittelter) Krankheiten, wie allergisch bedingtem Schnupfen (Rhinitis), allergisch bedingter Entzündung der Augenbindehaut (Konjunktivitis), allergischem Asthma bronchiale usw., die durch Exposition von nicht vermeidbaren Allergenen ausgelöst werden. Allergovit wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 5 Jahren. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile, unkontrolliertes Asthma, irreversible Veränderungen des Reaktionsorgans, entzündliche/fieberhafte Erkrankungen, schwere akute oder chronische Erkrankungen (auch maligne Tumorerkrankungen mit aktuellem Krankheitswert, aktive Tuberkulose), klinisch relevante Herz-Kreislaufinsuffizienz (bei kardiovaskulären Erkrankungen erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen nach Adrenalingabe), Erkrankungen des Immunsystems (schwere systemische Autoimmunerkrankungen, immunkomplexinduzierte Immunopathien, Immundefekte, Multiple Sklerose etc.), schwerwiegende systemische Reaktionen bei allergenspezifischer Immuntherapie in der Vergangenheit, schwere psychiatrische Störungen. **Nebenwirkungen:** Lokal- und/oder systemische Reaktionen (bis zum anaphylaktischen Schock), dann sofort die Allergenzufuhr unterbrechen. An der Injektionsstelle: Erythem, Juckreiz, Schwellung, Ödem, Schmerz, Reaktion, Urtikaria, Ausschlag, Bläschen, Wärme, Beschwerden, Ekzem, Erosion, Hämatom, Blutung, Überempfindlichkeit, Hypästhesie, Parästhesie, Empfindungslosigkeit, Verhärtung, Knötchen, Granulom; Verschlechterung von allergischen Symptomen; Bindehautödem; Konjunktivitis (allergisch); Augenjucken; Augenreizung; Mydriasis; okuläre Hyperämie; Schwellung des Augenlids; (allergische) Rhinitis; nasaler Pruritus; Rhinorrhoe; Niesen; Nasenverstopfung; Nasopharyngitis; Lippenschwellung; oraler Pruritus; Angioödem; Gesichtsschwellung; Kopfschmerzen; Migräne; Schwindel; Vertigo; Überempfindlichkeit; anaphylaktische Reaktion; anaphylaktischer Schock; Bewusstseinsverlust; Zyanose; Synkope; Unwohlsein; Unbehagen; Angstgefühl; Palpitationen; Tachykardie; Unruhe; Tremor; Kältschweißigkeit; Flush; orthostatische Hypotension; Blutdruck erniedrigt; Blutdruck diastolisch erhöht; Blutdruck systolisch erhöht; Fieber; Hitzegefühl; Kältegefühl; Brustkorbbeschwerden; Dyspnoe; Asthma; Husten; Giemen; forciertes Expirationsvolumen erniedrigt; expiratorischer Spitzenfluss erniedrigt; vermehrte Sekretion im Bereich der oberen Luftwege; Pseudokrupp; Rachenreizung; Engegefühl des Halses; Schmerzen im Oropharynx; Glossodynie; Hypersalivation; Dysphagie; Übelkeit; Erbrechen; Diarrhoe; gastrointestinale Erkrankung; Müdigkeit; Somnolenz; Schlaflosigkeit; Asthenie; Schmerz; Parästhesie; (periphere) Schwellung; peripheres Ödem; Harninkontinenz; Appetit erhöht; Gewichtszunahme; Arthralgie; muskuläre Schwäche; Schmerz in einer Extremität; Dermatitis atopisch; Dermatitis allergisch; Ekzem; (Verschlechterung) einer Neurodermitis; (generalisiertes) Erythem; Hautgranulom; Pruritus; (generalisierter) Ausschlag; Urtikaria; Hämatom; Lymphödem. Nach den Ergebnissen von klinischen Prüfungen können bei der Anwendung des verkürzten (4 Injektionen, nur bei Gräser- und Getreide- und Baumpollen) sowie des Ein-Stärken-Aufdosierungsschemas (3 Injektionen, nur bei Gräser- und Getreide- und Baumpollen) häufiger Nebenwirkungen auftreten als bei der Aufdosierung nach dem Standardschema. Die systemischen Reaktionen sind im Schweregrad nicht stärker ausgeprägt als beim Standardschema. Zudem tritt die Mehrzahl der Nebenwirkungen bei Anwendung des Ein-Stärken-Aufdosierungsschemas zu Beginn der Aufdosierungsphase auf. Das Sicherheitsprofil bei Kindern und Jugendlichen ist bei der Anwendung von Allergovit Pollenpräparaten mit dem der Erwachsenen vergleichbar. Es sind keine anderen Risiken in diesen Altersgruppen zu erwarten. Dieses Arzneimittel darf nur durch allergologisch erfahrene Ärzte verabreicht werden. Das verkürzte Aufdosierungsschema und das Ein-Stärken-Aufdosierungsschema sollten nur von Ärzten mit besonderer allergologischer Erfahrung durchgeführt werden. Weitere Hinweise zur Dosierung, Anwendungsweise etc. siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Verschreibungspflichtig **Stand der Information: April 2024**

### NOVO-HELISEN® Hausstaubmilben-Präparate

**Zusammensetzung:** Standardisierte Allergenextrakte aus Hausstaubmilben zur allergenspezifischen subkutanen Immuntherapie, standardisiert in Therapeutischen Einheiten (TE), an Aluminiumhydroxid adsorbiert, mit Phenol konserviert und in physiologischer Kochsalzlösung mit Natriumhydrogencarbonat suspendiert; Wasser für Injektionszwecke. Stärke 1: 50 TE/ml, Stärke 2: 500 TE/ml, Stärke 3: 5 000 TE/ml. **Anwendungsgebiete:** Kausale Behandlung allergischer (IgE-vermittelter) Krankheiten, wie allergischer Rhinitis, allergischer Konjunktivitis, allergischem Asthma bronchiale usw., die durch Exposition von Hausstaubmilbenallergenen ausgelöst werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile, unkontrolliertes Asthma, irreversible Veränderungen des Reaktionsorgans, entzündliche/fieberhafte Erkrankungen, schwere akute oder chronische Erkrankungen (auch maligne Tumorerkrankungen mit aktuellem Krankheitswert, aktive Tuberkulose), klinisch relevante Herz-Kreislaufinsuffizienz (bei kardiovaskulären Erkrankungen erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen nach Adrenalingabe), Erkrankungen des Immunsystems (schwere systemische Autoimmunerkrankungen, immunkomplexinduzierte Immunopathien, Immundefekte, Multiple Sklerose etc.), schwerwiegende systemische Reaktionen bei allergenspezifischer Immuntherapie in der Vergangenheit, schwere psychiatrische Störungen. **Nebenwirkungen:** Nach Injektion können lokale und/oder systemische allergische Reaktionen in verschiedenen Schweregraden bis hin zum anaphylaktischen Schock auftreten (dann sofort die Allergenzufuhr unterbrechen). Eine atopische Dermatitis sowie eine rheumatoide Arthritis können unter der Behandlung exazerbieren. Es wurden Fälle von Lymphadenopathie, Arthralgie, Myalgie, Nackenschmerzen und Wirbelsäulenschmerz beobachtet. An der Injektionsstelle kann es zum Auftreten von z.B. Erythemen, Schwellungen, Juckreiz, Schmerzen, Wärmegefühl, Verhärtungen, Knötchen, Granulomen, Urtikaria und Verfärbungen kommen. Zudem wurden Schmerzen in einer Extremität und feinmotorische Dysfunktion berichtet. Die Aufzählung aller beobachteten Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchs- oder Fachinformation. Bei Anwendung des Ein-Stärken-Aufdosierungsschemas können häufiger Nebenwirkungen auftreten als bei der Aufdosierung nach dem Standardschema. Die Nebenwirkungen beim Ein-Stärken-Schema treten zudem zu einem früheren Zeitpunkt in der Aufdosierungsphase auf als beim Standardschema. Die Art und der Schweregrad der Nebenwirkungen sind jedoch nicht stärker ausgeprägt als die im Standardschema. Das Sicherheitsprofil bei Kindern und Jugendlichen ist bei der Anwendung von Novo-Helisen Hausstaubmilbenpräparaten mit dem der Erwachsenen vergleichbar. Es sind keine anderen Risiken in dieser Altersgruppe zu erwarten. Für Kinder liegen keine Daten zum Ein-Stärken-Aufdosierungsschema vor. Dieses Arzneimittel darf nur durch allergologisch erfahrene Ärzte verabreicht werden. Das Ein-Stärken-Aufdosierungsschema und das Cluster-Aufdosierungsschema sollten nur von Ärzten mit besonderer allergologischer Erfahrung durchgeführt werden. Weitere Hinweise zur Dosierung, Anwendungsweise etc. siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Verschreibungspflichtig **Stand der Information: März 2023**