RECOMMANDATION POSOLOGIQUE[1]

ALLERGOVIT®

Traitement initial
Augmentation hebdomadaire pour atteindre la dose maximale*



en cas d'un début précoce de la thérapie pré-saisonnière**, continuation du traitement avec la dose maximale*, étendre les intervalles graduellement à 5 semaines au maximum



Modification de la dose en cas de dépassement de l'intervalle d'injections lors du traitement initial

Temps écoulé depuis la dernière injection	Modification de la dose
≤ 2 semaines	Augmentation possible
> 2 semaines	Reprendre à hauteur de 50% la dernière dose
> 4 semaines	Reprendre le traitementau départ avec le titre A

Modification de la dose du traitement de poursuite en cas de dépassement de l'intervalle (suite à un traitement initial)

Temps écoulé depuis la dernière injection	Modification de la dose
> 5 semaines	Reprendre à hauteur de 50% de la dernière dose, augmenter la dose en la doublant sur un intervalle de 7 à 14 jours
> 6 semaines	Reprendre le traitement au départ avec le titre A

* La posologie dépend dans tous les cas de la tolérance individuelle.
** Jusqu'à environ 1 semaine avant la saison pollinique attendue.

ALLERGÈNES POUR LE TRAITEMENT

ALLERGOVIT®

ALLERGÈNES INDIVIDUELS

Graminées	006	Mixtura Graminea	100 %
	133	Houlque laineuse	16,7 %
	140	Dactyle aggloméré	16,7 %
	157	Ivraie vivace	16,7 %
	177	Phléole des prés	16,7 %
	178	Pâturin des prés	16,7 %
	179	Fétuque des prés	16,7 %
Graminées/ Céréales	015	Mixtura Graminea-Cerealis	100 %
	006	Mixtura Graminea	55 %
	121	Orge	10 %
	126	Avoine	10 %
	158	Seigle	15 %
	173	Blé	10 %
Arbres	108	Bouleau	100 %
Herbes	106	Armoise	100 %
	123	Pariétaire	100 %
	169	Plantain	100 %

MÉLANGES

006	Graminées	60 %
158	Seigle	40 %
006	Graminées	60 %
108	Bouleau	20 %
158	Seigle	20 %
006	Graminées	60 %
106	Armoise	20 %
158	Seigle	20 %
006	Graminées	60 %
158	Seigle	20 %
169	Plantain	20 %
115	Aulne	50 %
129	Noisetier	50 %
108	Bouleau	35 %
115	Aulne	30 %
129	Noisetier	35 %

Références : 1) Information professionnelle Allergovit®, www.swissmedicinfo.ch. **Allergovit®, C :** *Principes actifs :* Extraits standardisés d'allergènes (allergoïdes) modifiés chimiquement issus de pollens. Les préparations Allergovit existent avec des compositions différentes et contiennent un ou plusieurs principes actifs. *Adjuvants :* Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem, Natrii hydrogenocarbonas, Natrii chloridum corresp. 3,5 mg de sodium, Phenolum, Aqua ad iniectabile q.s. ad suspensionem pro 1 ml. **I :** Maladies allergiques (IgE médiées) telles que la rhinite allergique, l'inflammation allergique de la conjonctive (conjonctivite), l'asthme bronchique allergique, etc., qui sont provoquées par l'inhalation d'allergènes ne pouvant être évités. **P :** Les unités d'Allergovit sont spécifiques au produit et ne sont donc pas interchangeables avec les unités d'autres préparations d'allergènes. Le traitement initial doit être commencé avec la dose la plus faible de la concentration la plus faible (force A). Le dosage doit être individualisé. **CI :** Hypersensibilité à l'un des composants, asthme insuffisamment traité ou asthme modéré à sévère (GINA III / IV), altérations irréversibles de l'organe sensibilisé, maladies inflammatoires / fébriles, maladies aiguës ou chroniques graves, insuffisance cardiovasculaire nette, sclérose en plaques, affections du système immunitaire, tuberculose active, troubles mentaux graves. **MGP :** Au moment de l'injection de désensibilisation, le patient ne doit présenter aucun symptôme aigu, en particulier aucun symptôme asthmatique. Prudence particulièrement : inhibiteurs de l'ECA et traitement par bêta-bloquants, manque de volonté du patient à participer. **IA :** L'administration concomitante d'agents anti-allergiques symptomatiques peut avoir une influence sur la limite de tolérance du patient. **G/A :** Pendant la grossesse, le médicament ne doit pas être administré, sauf nécessité absolue. **EI :** Réactions générales jusqu'au choc anaphylactique. Le patient doit être surveillé pendant au moins 30 minutes après chaque injection, puis être soumis à une évaluation médicale, Réactions au niveau du site d'injection, Céphalées. **P :** Allergovit *traitement initial :* titre A, titre B : 2 × 3 ml; *traitement d'entretien :* titre B : 1 × 3 ml. **C :** A. **RP :** Conserver au réfrigérateur (2 – 8 °C). Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants. **TA :** Allergopharma AG, 6331 Hünenberg. **Mise à jour :** Novembre 2024. **Plus d'informations** sur www.swissmedicinfo.ch

Allergopharma AG · Bösch 104 · 6331 Hünenberg · Tél 041 785 63 40 · Fax 041 785 63 49 · info.ch@allergopharma.com ·www.allergopharma.ch

allergopharma

34500382-CH-FR 04/2025